

0.5 setgray 0 0.5 setgray

Лекция 9

ЭЛЛИПС, ГИПЕРБОЛА И ПАРАБОЛА

§ 1. Каноническое уравнение эллипса

Определение 1. Эллисом называется геометрическое место точек M на плоскости, сумма расстояний от каждой из которых до двух фиксированных точек F_1 и F_2 , называемых фокусами эллипса, есть постоянная величина, которая больше расстояния между фокусами.




Рис. 1. Эллипс в канонической системе координат.

З а м е ч а н и е 1. Заметим из рисунка 1, что из треугольника $\triangle F_1 M F_2$ вытекает, что эта сумма расстояний не может быть меньше расстояния между точками $F_1 F_2$. С другой стороны, эта сумма расстояний может быть равна расстоянию между точками $F_1 F_2$ — тогда точка M лежит на отрезке $[F_1 F_2]$.

Особенно просто уравнение эллипса записывается в так называемой правой ортогональной декартовой системе координат. Пусть $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ — это прямоугольная правая декартова система координат, полученная следующим образом: точка O является серединой отрезка $F_1 F_2$, об-

разованного указанными в определении эллипса фокусами F_1 и F_2 ; в качестве орта \mathbf{i} возьмём вектор

$$\mathbf{i} = \frac{\overrightarrow{F_1 F_2}}{|\overrightarrow{F_1 F_2}|},$$

а орт \mathbf{j} ортогонален вектору \mathbf{i} и такой, что на заданной плоскости базис $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ является правым.

Определение 2. Построенная прямоугольная декартова система координат $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ называется канонической.

Замечание 2. Таким образом, в канонической системе координат $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ ось Ox проходит через фокусы $F_1 F_2$ с положительным направлением, совпадающим с направлением вектора $\overrightarrow{F_1 F_2}$. Ось Oy перпендикулярна оси Ox и получается на заданной ориентированной в пространстве плоскости (на которой лежит эллипс) поворотом оси Ox на угол $\pi/2$ против часовой стрелки.

Вывод канонического уравнения эллипса в канонической системе координат. Пусть в канонической системе координат $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ фокусы F_1 и F_2 эллипса имеют следующие координаты $F_1(-c, 0)$ и $F_2(c, 0)$, а точка $M(x, y)$ — это точка принадлежащая эллипсу. Согласно определению эллипса имеем

$$|\overrightarrow{F_1 M}| + |\overrightarrow{F_2 M}| = 2a > 0, \quad (1.1)$$

где

$$|\overrightarrow{F_1 M}| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}, \quad |\overrightarrow{F_2 M}| = \sqrt{(x-c)^2 + y^2},$$

причём по определению эллипса имеем $2a > 2c$. После избавления от радикалов мы получим такое уравнение

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1, \quad (1.2)$$

причём $a > c$.

□ Действительно, имеем следующую цепочку выражений:

$$\begin{aligned} \sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} &\Rightarrow \\ \Rightarrow (x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2 &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4xc = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} \Leftrightarrow xc = a^2 - a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} &\Rightarrow \\ \Rightarrow (xc - a^2)^2 = a^2((x-c)^2 + y^2) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x^2c^2 - 2xca^2 + a^4 = a^2y^2 + a^2x^2 + a^2c^2 - 2a^2xc &\Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow (a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2) \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1. \quad \square$$

Введём обозначение $b := \sqrt{a^2 - c^2}$, тогда уравнение (1.2) примет окончательный вид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b > 0. \quad (1.3)$$

Нам нужно теперь доказать, что все точки $M(x, y)$, удовлетворяющие уравнению (1.3), удовлетворяют уравнению (1.1).

□ Действительно, введём эксцентриситет

$$\varepsilon := \frac{c}{a} < 1. \quad (1.4)$$

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{F_1M}| &= \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + 2xc + c^2 + b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)} = \\ &= \sqrt{\left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)x^2 + 2xc + c^2 + b^2}. \end{aligned}$$

$$b^2 = a^2 - c^2 \Rightarrow \frac{b^2}{a^2} = 1 - \frac{c^2}{a^2} \Rightarrow 1 - \frac{b^2}{a^2} = \varepsilon^2,$$

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{F_1M}| &= \sqrt{\left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)x^2 + 2xc + c^2 + b^2} = \\ &= \sqrt{\varepsilon^2x^2 + 2\varepsilon ax + a^2} = |\varepsilon x + a| = \varepsilon x + a > 0, \quad (1.5) \end{aligned}$$

поскольку $|x| \leq a$ и $0 < \varepsilon < 1$. Аналогичным образом получаем равенство

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{F_2M}| &= \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 - 2xc + c^2 + b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)} = \\ &= \sqrt{\left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)x^2 - 2xc + c^2 + b^2} = \sqrt{\frac{c^2}{a^2}x^2 - 2xc + a^2} = \\ &= \sqrt{\varepsilon^2x^2 + 2a\varepsilon x + a^2} = |\varepsilon x - a| = a - \varepsilon x > 0. \quad (1.6) \end{aligned}$$

Поэтому

$$|\overrightarrow{F_1M}| + |\overrightarrow{F_2M}| = \varepsilon x + a + a - \varepsilon x = 2a. \quad \square$$

Форма эллипса. Заметим, что из уравнения (1.3) вытекает

$$|x| \leq a, \quad |y| \leq b.$$

□ Действительно,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} \leq 1 \quad \text{и} \quad \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \Rightarrow |x| \leq a \quad \text{и} \quad |y| \leq b. \quad \boxtimes$$

Следовательно, эллипс расположен в этом прямоугольнике.

Директориальное свойство эллипса. Из уравнений (1.5) и (1.6) вытекают равенства:

$$|\mathbf{r}_1| = |\overrightarrow{F_1M}| = a + x\varepsilon = \varepsilon \left(\frac{a}{\varepsilon} + x \right) = \varepsilon d_1 \Rightarrow \frac{|\mathbf{r}_1|}{d_1} = \varepsilon,$$

$$|\mathbf{r}_2| = |\overrightarrow{F_2M}| = a - x\varepsilon = \varepsilon \left(\frac{a}{\varepsilon} - x \right) = \varepsilon d_2 \Rightarrow \frac{|\mathbf{r}_2|}{d_2} = \varepsilon.$$

Докажем, что d_1 — это расстояние от точки $M(x, y)$ до прямой $x = -a/\varepsilon$, а d_2 — это расстояние от точки $M(x, y)$ до прямой $x = a/\varepsilon$.




Рис. 2. Эллипс и его директрисы.

□ Действительно, сначала найдём расстояние от произвольной точки $M(x, y)$ эллипса в канонической декартовой системе координат $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ до прямой l_1 , заданной уравнением

$$x = -\frac{a}{\varepsilon}.$$

С этой целью опустим перпендикуляр из точки $M(x, y)$ на эту прямую. Точка M_1 пересечения прямой l_1 и этого перпендикуляра имеет координаты

$$M_1 \left(-\frac{a}{\varepsilon}, y \right).$$

Но тогда искомое расстояние равно

$$d_1 = \left| \overrightarrow{MM_1} \right| = \sqrt{\left(x + \frac{a}{\varepsilon}\right)^2 + (y - y)^2} = \left|x + \frac{a}{\varepsilon}\right| = \frac{a}{\varepsilon} + x,$$

поскольку для точек $M(x, y)$ эллипса имеем $|x| \leq 1$ и $\varepsilon \in (0, 1)$. Найдём теперь расстояние от точки $M(x, y)$ до прямой l_2 , заданной уравнением

$$x = \frac{a}{\varepsilon}.$$

С этой целью опустим перпендикуляр из точки $M(x, y)$ на прямую l_2 . Пусть M_2 — это точка пересечения перпендикуляра и прямой l_2 . Тогда точка M_2 имеет следующие координаты:

$$M_2\left(\frac{a}{\varepsilon}, y\right).$$

Но тогда искомое расстояние равно

$$d_2 = \left| \overrightarrow{MM_2} \right| = \sqrt{\left(x - \frac{a}{\varepsilon}\right)^2 + (y - y)^2} = \left|x - \frac{a}{\varepsilon}\right| = \frac{a}{\varepsilon} - x,$$

поскольку для точек $M(x, y)$ эллипса имеем

$$|x| \leq a \quad \text{и} \quad \varepsilon \in (0, 1). \quad \square$$

Определение 3. Прямые, в канонической системе координат имеющие уравнения $x = \pm a/\varepsilon$, называются директрисами.

Теорема 1. Отношение расстояния $|r_j|$ от фокуса F_j до точки $M(x, y)$ эллипса к расстоянию d_j от этой точки до соответствующей директрисы при $j = 1, 2$ в канонической системе координат есть величина постоянная, равная ε .

§ 2. Каноническое уравнение гиперболы

Определение 4. Гиперболой называется геометрическое место точек M на плоскости, модуль разности расстояний от которой до двух фиксированных точек F_1 и F_2 , называемые полюсами, есть величина постоянная, меньшая расстояния между фокусами и не равная нулю.

Замечание 3. Отметим, что геометрическое место точек M таких, что

$$\left| \left| \overrightarrow{MF_1} \right| - \left| \overrightarrow{MF_2} \right| \right| = \left| \overrightarrow{F_1F_2} \right|$$

— это два непересекающихся луча прямой (F_1F_2) , исходящих из точек F_1 и F_2 и противоположно направленных. Кроме того, геометрическое место точек M :

$$\left| \left| \overrightarrow{MF_1} \right| - \left| \overrightarrow{MF_2} \right| \right| = 0$$

— это прямая, проходящая через середину отрезка $[F_1F_2]$ и перпендикулярно этому отрезку.




Рис. 3. Исключительные случаи.

Определение 5. Канонической системой декартовых прямоугольных координат называется та же система координат $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$, что и в случае эллипса.




Рис. 4. Гипербола в канонической системе координат.

Уравнение гиперболы в канонической системе координат. Согласно определению 5 координаты фокусов имеют вид $F_1(-c, 0)$ и $F_2(c, 0)$. Тогда расстояния от произвольной точки $M(x, y)$ гиперболы до фокусов имеют следующий вид:

$$|\mathbf{r}_1| = |\overrightarrow{F_1M}| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}, \quad |\mathbf{r}_2| = |\overrightarrow{F_2M}| = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}.$$

Тогда согласно определению 4 имеем

$$\left| \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \right| = 2a > 0, \quad a < c. \quad (2.1)$$

Уничтожив радикалы мы получим равенство

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1. \quad (2.2)$$

□ Действительно, имеет место следующая цепочка равенств:

$$\begin{aligned} \left| \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \right| &= 2a, \quad 2a < 2c \Rightarrow \\ \Rightarrow \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} &= \pm 2a \Rightarrow \\ \Rightarrow (x+c)^2 + y^2 &= 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow 4xc &= 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} \Rightarrow (xc - a^2)^2 = a^2((x-c)^2 + y^2) \Rightarrow \\ \Rightarrow x^2c^2 + a^4 - 2xca^2 &= a^2x^2 + a^2y^2 + a^2c^2 - 2xca^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow x^2(c^2 - a^2) - a^2y^2 &= a^2(c^2 - a^2) \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1. \quad \square \end{aligned}$$

Введём обозначение $b^2 = c^2 - a^2$ и получим искомое уравнение

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (2.3)$$

Обратно покажем, что из уравнения (2.3) вытекает уравнение (2.1).

□ Действительно, сначала введём эксцентриситет

$$\varepsilon := \frac{c}{a} > 1.$$

$$\frac{b^2}{a^2} + 1 = \frac{c^2}{a^2} \Rightarrow \frac{b^2}{a^2} + 1 = \varepsilon^2.$$

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}_1|^2 &= \left| \overrightarrow{F_1M} \right|^2 = (x+c)^2 + y^2 = (x+c)^2 + b^2 \left(\frac{x^2}{a^2} - 1 \right) = \\ &= x^2 + 2xc + c^2 + \frac{b^2}{a^2}x^2 - b^2 = \varepsilon^2x^2 + 2a\varepsilon x + a^2 = |\varepsilon x + a|^2. \quad (2.4) \end{aligned}$$

Аналогичным образом для фокуса $F_2(0, c)$ получаем следующую цепочку равенств:

$$|\mathbf{r}_2|^2 = \left| \overrightarrow{F_2M} \right|^2 = (x-c)^2 + y^2 = x^2 - 2xc + c^2 + b^2 \left(\frac{x^2}{a^2} - 1 \right) =$$

$$= \left(1 + \frac{b^2}{a^2}\right)x^2 - 2xc + c^2 - b^2 = \varepsilon^2 x^2 - 2\varepsilon ax + a^2 = |\varepsilon x - a|^2. \quad (2.5)$$

Заметим, что $|\varepsilon x| > |x| \geq a$ и поэтому из формул (2.4) и (2.5) вытекают равенства

$$|\mathbf{r}_1| = \begin{cases} x\varepsilon + a, & \text{если } x > 0; \\ -x\varepsilon - a, & \text{если } x < 0, \end{cases} \quad |\mathbf{r}_2| = \begin{cases} x\varepsilon - a, & \text{если } x > 0; \\ -x\varepsilon + a, & \text{если } x < 0, \end{cases} \quad (2.6)$$

Таким образом, из равенств (2.6) имеем

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}_1| - |\mathbf{r}_2| &= 2a, & \text{если } x > 0, \\ |\mathbf{r}_1| - |\mathbf{r}_2| &= -2a, & \text{если } x < 0. \end{aligned}$$

Следовательно, во всех случаях

$$||\mathbf{r}_1| - |\mathbf{r}_2|| = 2a. \quad \square$$

Анализ формы гиперболы. Из уравнения гиперболы (2.3) вытекает равенство

$$\frac{x^2}{a^2} = 1 + \frac{y^2}{b^2} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} \geq 1 \Rightarrow |x| \geq |a| \Rightarrow |x| \geq a.$$

Если $|x| \neq a$, то

$$y^2 = b^2 \left(\frac{x^2}{a^2} - 1 \right) \Rightarrow |y| = b \sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1} = b \frac{|x|}{a} \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}} < \frac{b}{a} |x|.$$

Отсюда вытекает неравенство

$$-\frac{b}{a}x < y < \frac{b}{a}x \quad \text{при } |x| > a,$$

а случаю $x = \pm a$ соответствует только $y = 0$. Обе ветви гиперболы лежат внутри области, заключённой между двумя прямыми

$$y = -\frac{b}{a}x, \quad y = \frac{b}{a}x \quad (2.7)$$

и вне полосы $|x| < a$. Эти прямые являются асимптотами гиперболы.

□ Действительно, имеем

$$\begin{aligned} |y| &= b \frac{|x|}{a} \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}} = b \frac{|x|}{a} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{a^2}{x^2} + \bar{o} \left(\frac{1}{|x|^2} \right) \right) = \\ &= b \frac{|x|}{a} - \frac{ab}{2} \frac{1}{|x|} + \bar{o} \left(\frac{1}{|x|} \right). \quad \square \end{aligned}$$

Директориальное свойство гиперболы. Заметим, что формулы (2.6) можно объединить следующим образом:

$$\begin{cases} |\mathbf{r}_1| = \varepsilon(x + a/\varepsilon) \\ |\mathbf{r}_2| = \varepsilon(x - a/\varepsilon) \end{cases} \quad \text{при } x > 0, \quad (2.8)$$

$$\begin{cases} |\mathbf{r}_1| = \varepsilon(-x - a/\varepsilon) \\ |\mathbf{r}_2| = \varepsilon(-x + a/\varepsilon) \end{cases} \quad \text{при } x < 0. \quad (2.9)$$




Рис. 5. Гипербола и её директрисы.

Дадим определение.

Определение 6. Прямые, заданные в канонической системе координат $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ уравнениями

$$x = \pm \frac{a}{\varepsilon},$$

называются директрисами.

Справедлива следующая теорема:

Теорема 2. Отношение расстояния $|\mathbf{r}_j|$ от фокуса F_j до точки $M(x, y)$ гиперболы к расстоянию d_j от этой точки до соответствующей директрисы при $j = 1, 2$ есть величина постоянная, равная ε .

Доказательство.

Найдём расстояние от точки $M(x, y)$ гиперболы в канонической декартовой системе координат $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ до прямой

$$l_1: x = -\frac{a}{\varepsilon}.$$

Опустим перпендикуляр из точки $M(x, y)$ на эту прямую. Пусть M_1 — это основание этого перпендикуляра. Эта точка имеет следующие координаты:

$$M_1 = \left(-\frac{a}{\varepsilon}, y\right),$$

а расстояние от точки M до прямой l_1 равно

$$|\overrightarrow{MM_1}| = \sqrt{\left(x + \frac{a}{\varepsilon}\right)^2 + (y - y)^2} = \left|x + \frac{a}{\varepsilon}\right| = \begin{cases} x + \frac{a}{\varepsilon}, & \text{если } x > 0; \\ -x - \frac{a}{\varepsilon}, & \text{если } x < 0, \end{cases}$$

поскольку если $x > 0$, то

$$x + \frac{a}{\varepsilon} > 0.$$

Если же $x < 0$, то для точек гиперболы имеем $-x \geq a$ и при этом

$$-x - \frac{a}{\varepsilon} \geq a - \frac{a}{\varepsilon} = a \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right) \geq 0,$$

поскольку $\varepsilon > 1$.

Найдём теперь расстояние от точки $M(x, y)$ гиперболы до прямой

$$l_2 : x = \frac{a}{\varepsilon}.$$

С этой целью опустим перпендикуляр из точки $M(x, y)$ перпендикуляр на прямую l_2 . Пусть M_2 — это основание этого перпендикуляра. Эта точка имеет следующие координаты:

$$M_2 = \left(\frac{a}{\varepsilon}, y\right).$$

Искомое расстояние от точки $M(x, y)$ до прямой l_2 равно

$$|\overrightarrow{MM_2}| = \sqrt{\left(x - \frac{a}{\varepsilon}\right)^2 + (y - y)^2} = \left|x - \frac{a}{\varepsilon}\right| = \begin{cases} x - \frac{a}{\varepsilon}, & \text{если } x > 0; \\ -x + \frac{a}{\varepsilon}, & \text{если } x < 0, \end{cases}$$

поскольку при $x > 0$ для точек гиперболы имеем $x > a$ и поэтому

$$x - \frac{a}{\varepsilon} \geq a - \frac{a}{\varepsilon} = a \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right) > 0, \quad \varepsilon > 1.$$

Если же $x < 0$, то для точек гиперболы имеем $x \leq -a$ при этом имеем

$$-x + \frac{a}{\varepsilon} \geq a + \frac{a}{\varepsilon} > 0.$$

Теорема доказана.

Взаимно сопряжённые гиперболы.

Определение 7. Две гиперболы

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{и} \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1, \quad c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

называются взаимно сопряжёнными.

Нетрудно заметить, что фокусы сопряженных гипербол лежат на окружности

$$|x| = c = \sqrt{a^2 + b^2}.$$




Рис. 6. Взаимно сопряжённые гиперболы.

§ 3. Каноническое уравнение параболы

Определение 8. *Параболой называется геометрическое множество точек M на плоскости, расстояние от каждой из которых до некоторой точки F , называемой фокусом, равно расстоянию до некоторой прямой, называемой директрисой.*

Замечание 4. Опустим из точки F перпендикуляр на директрису. Пусть F_1 — это основание перпендикуляра. Пусть точка O — это середина отрезка $[F_1F]$, а вектор

$$\mathbf{i} := \frac{\overrightarrow{F_1F}}{|\overrightarrow{F_1F}|}. \quad (3.1)$$

Единичный вектор \mathbf{j} выберем ортогональным вектору \mathbf{i} таким образом, чтобы упорядоченная двойка $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ была правой на заданной ориентированной плоскости.

Определение 9. *Канонической декартовой прямоугольной системой координат называется система координат $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$.*

Уравнение параболы в канонической системе координат. Из определения 9 вытекает, что в канонической системе координат

$$F(p/2, 0) \text{ — фокус, } x = -\frac{p}{2} \text{ — уравнение директрисы.}$$




Рис. 7. Парабола в канонической системе координат.

Пусть $M(x, y)$ — произвольная точка параболы. Тогда

$$|\overrightarrow{FM}| = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}.$$

Найдём расстояние от произвольной точки $M(x, y)$ параболы до директрисы

$$x = -\frac{p}{2}.$$

Пусть M_1 — это основание перпендикуляра, опущенного из точки $M(x, y)$ на директрису. Тогда точка M_1 имеет координаты

$$M_1 = \left(-\frac{p}{2}, y\right).$$

Расстояние от точки $M(x, y)$ до директрисы равно

$$|\overrightarrow{M_1M}| = \sqrt{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + (y - y)^2} = \left|x + \frac{p}{2}\right|.$$

Согласно определению 8 параболы её уравнение имеет следующий вид:

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = \left|x + \frac{p}{2}\right|, \quad (3.2)$$

из которого вытекает уравнение

$$y^2 = 2px. \quad (3.3)$$

Обратно из уравнения (3.3) имеем

$$y^2 = 2px = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{p}{2}\right)^2,$$

$$\left|x + \frac{p}{2}\right| = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}.$$

§ 4. Касательные к эллипсу, гиперболе и параболе

Определение 10. *Касательной к эллипсу называется прямая, имеющая с эллипсом единственную общую точку.*

Вывод уравнения касательной к эллипсу. Необходимо и достаточно найти условия существования единственного решения следующей системы уравнений:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = x_0 + lt; \\ y = y_0 + mt, \end{cases} \quad (4.1)$$

Справедливо следующее равенство:

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + 2t \left(\frac{x_0 l}{a^2} + \frac{y_0 m}{b^2} \right) + t^2 \left(\frac{l^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} \right) = 1. \quad (4.2)$$

Пусть точка $M_0(x_0, y_0)$ лежит на эллипсе, тогда приходим к следующему условию

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1. \quad (4.3)$$

Кроме того, тогда число $t = 0$ должно быть единственным решением квадратного уравнения (4.2). Следовательно, приходим к равенству

$$\frac{x_0 l}{a^2} + \frac{y_0 m}{b^2} = 0. \quad (4.4)$$

В качестве направляющего вектора искомой касательной можно взять числа

$$l = \frac{y_0}{b^2}, \quad m = -\frac{x_0}{a^2}.$$

Тогда уравнение касательной имеет следующий вид:

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} \Leftrightarrow \frac{x - x_0}{y_0/b^2} = \frac{y - y_0}{-x_0/a^2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) = 0. \quad (4.5)$$

В силу первого равенства из (4.3) приходим к искомому уравнению (в канонической системе координат)

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1. \quad (4.6)$$

Определение 11. *Касательной к гиперболе называется прямая, имеющая с гиперболой единственную общую точку и не параллельная асимптотам гиперболы.*

Уравнение касательной к гиперболе. Уравнение касательной к точке $M_0(x_0, y_0)$ гиперболы в канонической системе координат имеет следующий вид:

$$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1. \quad (4.7)$$

□ Действительно, имеют место следующие уравнения

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = x_0 + lt; \\ y = y_0 + mt, \end{cases} \quad (4.8)$$

После подстановки уравнения прямой в уравнение гиперболы получим следующее равенство:

$$\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} + 2t \left(\frac{lx_0}{a^2} - \frac{my_0}{b^2} \right) + \left(\frac{l^2}{a^2} - \frac{m^2}{b^2} \right) t^2 = 1. \quad (4.9)$$

Потребуем, чтобы точка $M_0(x_0, y_0)$ принадлежала гиперболе, тогда получим равенство

$$\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1,$$

в силу которого имеем из (4.9) получим следующее уравнение:

$$2Bt + At^2 = 0, \quad (4.10)$$

где

$$A := \frac{l^2}{a^2} - \frac{m^2}{b^2}, \quad B := \frac{lx_0}{a^2} - \frac{my_0}{b^2}. \quad (4.11)$$

Согласно определению 11 касательная к гиперболе непараллельна асимптотам, поэтому векторы

$$\mathbf{a}_1 = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}, \quad \mathbf{a}_2 = a\mathbf{i} - b\mathbf{j}$$

не коллинеарны направляющему вектору касательной

$$\mathbf{a} = l\mathbf{i} + m\mathbf{j}.$$

Следовательно,

$$A \neq 0.$$

Поэтому необходимым и достаточным условием, чтобы система уравнений (4.8) имела единственное решение $t = 0$ — это условие, чтобы

$$B = \frac{lx_0}{a^2} - \frac{my_0}{b^2} = 0. \quad (4.12)$$

В качестве координат $\{l, m\}$ направляющего вектора касательной можно взять следующие

$$l = \frac{y_0}{b^2}, \quad m = \frac{x_0}{a^2}. \quad (4.13)$$

Итак, уравнение касательной имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} &\Leftrightarrow \frac{x - x_0}{y_0/b^2} = \frac{y - y_0}{x_0/a^2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{x_0}{a^2}(x - x_0) - \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) = 0 \Leftrightarrow \frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1. \quad \square \quad (4.14) \end{aligned}$$

Определение 12. *Касательной к параболе называется прямая, имеющая с параболой единственную точку и не параллельная оси параболы.*

Уравнение касательной к параболе. Уравнение касательной к точке $M_0(x_0, y_0)$ параболы в канонической системе координат имеет следующий вид:

$$yy_0 = p(x + x_0). \quad (4.15)$$

□ Действительно, будем искать единственное решение системы уравнений

$$y^2 = 2px \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = x_0 + lt; \\ y = y_0 + mt, \end{cases} \quad (4.16)$$

После подстановки уравнения прямой в уравнение параболы получим следующее уравнение:

$$y_0^2 + 2my_0t + m^2t^2 = 2px_0 + 2plt. \quad (4.17)$$

Потребуем, чтобы

$$y_0^2 = 2px_0. \quad (4.18)$$

Согласно определению 12 имеем направляющий вектор искомой касательной

$$\mathbf{a} = l\mathbf{i} + m\mathbf{j}$$

не должен быть коллинеарен вектору

$$\mathbf{a}_1 = \mathbf{i},$$

который сонаправлен с осью параболы. Следовательно, $m \neq 0$. Итак, с учётом (4.18) из (4.17) получим уравнение

$$m^2t^2 + (my_0 - pl)t = 0. \quad (4.19)$$

Поскольку $m \neq 0$, то для существования единственного решения $t = 0$ последнего квадратного уравнения, необходимо и достаточно, чтобы

$$my_0 - pl = 0.$$

Тогда в качестве координат направляющего вектора искомой касательной можно взять

$$l = \frac{y_0}{p}, \quad m = 1.$$

Итак, уравнение касательной имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} &\Leftrightarrow \frac{x - x_0}{y_0/p} = \frac{y - y_0}{1} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{y_0}{p}(y - y_0) = x - x_0 \Leftrightarrow \frac{yy_0}{p} = x - x_0 + \frac{y_0^2}{p} = x - x_0 + 2x_0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow yy_0 = p(x + x_0). \quad \square \quad (4.20) \end{aligned}$$

§ 5. Оптические свойства эллипса, гиперболы и параболы

Оптическое свойство эллипса.

Теорема 3. Фокальные радиусы произвольной точки M_0 эллипса составляют равные углы с касательной к эллипсу в точке M_0 .

Доказательство.




Рис. 8. Оптическое свойство эллипса.

Вычисли расстояние от фокусов F_1 и F_2 до касательной в точке $M_0(x_0, y_0)$. Поскольку уравнение касательной в канонической системе координат имеет вид

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1,$$

а фокусы имеют координаты $F_1(-c, 0)$ и $F_2(c, 0)$ имеют место равенства

$$\begin{aligned} \left| \overrightarrow{F_1 D_1} \right| &= \frac{|(-c) \cdot x_0/a^2 + 0 \cdot y_0/b^2 - 1|}{\sqrt{x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4}} = \frac{|\varepsilon x_0 + a|}{a\sqrt{x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4}} = \\ &= \frac{\varepsilon x_0 + a}{a\sqrt{x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4}} = \frac{|\mathbf{r}_1|}{a\sqrt{x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4}}. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\sin \alpha_1 = \frac{\left| \overrightarrow{F_1 D_1} \right|}{\left| \overrightarrow{F_1 M_0} \right|} = \frac{\left| \overrightarrow{F_1 D_1} \right|}{|\mathbf{r}_1|} = \frac{1}{a\sqrt{x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4}}.$$

Аналогичным образом получаем равенство

$$\begin{aligned} \left| \overrightarrow{F_2 D_2} \right| &= \frac{|c \cdot x_0/a^2 + 0 \cdot y_0/b^2 - 1|}{\sqrt{x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4}} = \frac{|\varepsilon x_0 - a|}{a\sqrt{x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4}} = \\ &= \frac{a - \varepsilon x_0}{a\sqrt{x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4}} = \frac{|\mathbf{r}_2|}{a\sqrt{x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4}}. \end{aligned}$$

Отсюда вытекает равенство

$$\sin \alpha_2 = \frac{\left| \overrightarrow{F_2 D_2} \right|}{\left| \overrightarrow{F_2 M_0} \right|} = \frac{\left| \overrightarrow{F_2 D_2} \right|}{|\mathbf{r}_2|} = \frac{1}{a\sqrt{x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4}}.$$

Из равенства синусов углов вытекает равенство углов.

Теорема доказана.

Оптическое свойство гиперболы.

Теорема 4. Фокальные радиусы произвольной точки M_0 гиперболы составляют равные углы с касательной к гиперболе, проведенной через точку M_0 .

Доказательство. Уравнение касательной к точке $M_0(x_0, y_0)$ гиперболы имеет следующий вид:

$$\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$

Поэтому расстояние от фокуса $F_1(-c, 0)$ до этой касательной равно

$$\left| \overrightarrow{F_1 D_1} \right| = \frac{\left| -\frac{x_0 c}{a^2} - 1 \right|}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}}} = \frac{1}{a\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}}} |\varepsilon x_0 + a| = \frac{1}{a\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}}} \left| \overrightarrow{F_1 M_0} \right|,$$




Рис. 9. Оптическое свойство гиперболы.

а расстояние от фокуса $F_2(c, 0)$ до указанной касательной равно

$$\left| \overrightarrow{F_2 D_2} \right| = \frac{\left| \frac{x_0 c}{a^2} - 1 \right|}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}}} = \frac{1}{a \sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}}} |\varepsilon x_0 - a| = \frac{1}{a \sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}}} \left| \overrightarrow{F_2 M_0} \right|.$$

Таким образом, приходим к следующей цепочке равенств:

$$\sin \alpha_1 = \frac{\left| \overrightarrow{F_1 D_1} \right|}{\left| \overrightarrow{F_1 M_0} \right|} = \frac{\left| \overrightarrow{F_2 D_2} \right|}{\left| \overrightarrow{F_2 M_0} \right|} = \sin \alpha_2.$$

Теорема доказана.

Оптическое свойство параболы.

Теорема 5. Фокальный радиус произвольной точки M_0 параболы и ось параболы составляют равные углы с касательной к параболе, проведённой через точку M_0 .

Доказательство. Из уравнения касательной

$$y y_0 = p(x + x_0)$$

к параболе в точке $M_0(x_0, y_0)$ вытекает, что касательная пересекает ось абсцисс Ox в точке $A(-x_0, 0)$.

Следовательно, с одной стороны,

$$|AO| = x_0, \quad |AF| = |AO| + |OF| = x_0 + \frac{p}{2}.$$

С другой стороны, имеем согласно определению параболы

$$|M_0 F| = |M_0 D| = |M_0 C| + |CD| = x_0 + \frac{p}{2}.$$




Рис. 10. Оптическое свойство параболы.

Таким образом, $|AF| = |M_0F|$. Значит,

$$\angle FAM_0 = \angle AM_0F,$$

но

$$\angle FAM_0 = \angle DM_0A \Rightarrow \angle DM_0A = \angle AM_0F.$$

Теорема доказана.

§ 6. Полярные уравнения эллипса, гиперболы и параболы

Полярное уравнение параболы. Введём полярную систему координат $\{F, \mathbf{i}\}$, где F — это фокус параболы, а полярная ось определяется вектором \mathbf{i} из равенства (3.1) и, в частности, совпадает с осью абсцисс Ox соответствующей канонической прямоугольной декартовой системы координат $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$.

Тогда справедливы следующие формулы, связывающие декартовы координаты в канонической системе координат $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ с полярными координатами в полярной системе координат $\{F, \mathbf{i}\}$ точек плоскости:

$$\begin{cases} x - p/2 = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi. \end{cases} \quad (6.1)$$

Согласно определению параболы имеет место равенство

$$r = x + \frac{p}{2}. \quad (6.2)$$

Из формул (6.1) и (6.2) вытекает равенство

$$r = p + r \cos \varphi,$$




Рис. 11. Парабола в полярной системе координат.

из которого получаем полярное уравнение параболы

$$r = \frac{p}{1 - \cos \varphi}. \quad (6.3)$$

Замечание 5. Отметим, что углы $\varphi = 0$ и $\varphi = 2\pi$ не отвечает ни одна точка параболы. Поэтому знаменатель в полярном уравнении параболы не обращается в ноль.


Полярное уравнение эллипса-I. Выберем полярную систему координат $\{F_1, \mathbf{i}\}$, где

$$\mathbf{i} = \frac{\overrightarrow{F_1 F_2}}{|\overrightarrow{F_1 F_2}|},$$

т. е. в качестве полюса выберем левый фокус F_1 , а в качестве полярной оси выберем ось абсцисс соответствующей канонической декартовой системы координат $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$.

Справедливы следующие формулы, связывающие декартовы (x, y) и полярные координаты (r, φ) точек плоскости

$$\begin{cases} x + c = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi. \end{cases} \quad (6.4)$$

Рис. 12. Эллипс в полярной системе координат $\{F_1, \mathbf{i}\}$.

в канонической декартовой системе координат $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ и в выбранной полярной системе координат $\{F_1, \mathbf{i}\}$.

Кроме того, справедливо следующее равенство для эллипса

$$r = \varepsilon x + a. \quad (6.5)$$

Из уравнений (6.7) и (6.5) вытекает следующая цепочка равенств:

$$r = \varepsilon(-c + r \cos \varphi) + a \Rightarrow r = \frac{p}{1 - \varepsilon \cos \varphi},$$

где

$$\varepsilon = \frac{c}{a} < 1, \quad p := -\varepsilon c + a = \frac{a^2 - c^2}{a} = \frac{b^2}{a}.$$

Таким образом, получили полярное уравнение эллипса

$$r = \frac{p}{1 - \varepsilon \cos \varphi}, \quad p = \frac{b^2}{a}, \quad \varepsilon = \frac{c}{a} < 1, \quad \varphi \in [0, 2\pi) \quad (6.6)$$

в полярной системе координат $\{F_1, \mathbf{i}\}$.


Замечание 6. Поскольку $\varepsilon \in (0, 1)$, то знаменатель в полярном уравнении (6.6) эллипса никогда не обращается в ноль.

Полярное уравнение эллипса-II. Выберем полярную систему координат $\{F_2, \mathbf{i}\}$.

Справедливы следующие формулы, связывающие декартовы (x, y) и полярные координаты (r, φ) точек плоскости

$$\begin{cases} x - c = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi. \end{cases} \quad (6.7)$$

в канонической декартовой системе координат $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ и в выбранной полярной системе координат $\{F_2, \mathbf{i}\}$.

Рис. 13. Эллипс в полярной системе координат $\{F_2, \mathbf{i}\}$.

Для эллипса в выбранной полярной системе координат $\{F_2, \mathbf{i}\}$ справедливо следующее равенство:

$$r = a - \varepsilon x \Rightarrow r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \varphi}, \quad p = \frac{b^2}{a}. \quad (6.8)$$

Полярное уравнение гиперболы -I. Выберем полярную систему координат $\{F_2, \mathbf{i}\}$, где

$$\mathbf{i} := \frac{\overrightarrow{F_1 F_2}}{|\overrightarrow{F_1 F_2}|},$$

т.е. полюс полярной системы координат совпадает с фокусом F_2 , а полярная ось совпадает с осью абсцисс Ox канонической декартовой системы координат $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$.

Связь декартовых и полярных координат точек плоскости имеет следующий вид:

$$\begin{cases} x - c = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi. \end{cases} \quad (6.9)$$


Для правой ветви гиперболы ($x > 0$)

$$r = \varepsilon x - a. \quad (6.10)$$

Из уравнений (6.9) и (6.10) приходим к полярному уравнению правой ветви гиперболы

$$r = \frac{p}{1 - \varepsilon \cos \varphi}, \quad p = \frac{b^2}{a}, \quad \varepsilon = \frac{c}{a} > 1 \quad (6.11)$$

в полярной системе координат $\{F_2, \mathbf{i}\}$.

Рис. 14. Гипербола в полярной системе координат $\{F_2, \mathbf{i}\}$.

З а м е ч а н и е 7. Отметим, что в полярной системе координат $\{F_2, \mathbf{i}\}$ уравнение правой ветви гиперболы корректно при

$$\cos \varphi < \frac{1}{\varepsilon} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} =: \cos \vartheta,$$

т. е. когда

$$\vartheta < \varphi < 2\pi - \vartheta,$$

но именно таким углам φ соответствуют точки правой ветви гиперболы в полярной системе координат $\{F_2, \mathbf{i}\}$.

Для левой ветви гиперболы ($x < 0$) имеем равенство

$$r = -\varepsilon x + a. \quad (6.12)$$


Поэтом из равенств (6.9) и (6.12) получим следующее полярное уравнение левой ветви гиперболы:

$$r = -\frac{p}{1 + \varepsilon \cos \varphi}, \quad p = \frac{b^2}{a}. \quad (6.13)$$

З а м е ч а н и е 8. Уравнение (6.13) левой ветви гиперболы в полярной системе координат $\{F_2, \mathbf{i}\}$ корректно при условии, что

$$\cos \varphi < -\frac{1}{\varepsilon},$$

но именно этим углам соответствуют точки левой ветви гиперболы.

Рис. 15. Гипербола в полярной системе координат $\{F_1, \mathbf{i}\}$.

Полярное уравнение гиперболы-II. Выберем полярную систему координат $\{F_1, \mathbf{i}\}$, т.е. полюс полярной системы координат совпадает с фокусом F_1 , а полярная ось совпадает с осью абсцисс Ox канонической декартовой системы координат $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}\}$. Связь декартовых и полярных координат точек плоскости имеет следующий вид:

$$\begin{cases} x + c = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi. \end{cases} \quad (6.14)$$

Рассмотрим сначала правую ветвь $x > 0$. Тогда имеет место следующее равенство:

$$r = \varepsilon x + a \Rightarrow r = -\frac{p}{1 - \varepsilon \cos \varphi}, \quad p = \frac{b^2}{a}. \quad (6.15)$$

З а м е ч а н и е 9. Это уравнение правой ветви гиперболы корректно при условии, что

$$\cos \varphi > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \varphi \in (-\vartheta, \vartheta), \quad \cos \vartheta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}},$$

но именно этим углам соответствуют точки правой ветви гиперболы.

Рассмотрим теперь левую ветвь гиперболы ($x < 0$). Для левой ветви справедливо следующее равенство:

$$r = -\varepsilon x - a \Rightarrow r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \varphi}. \quad (6.16)$$

З а м е ч а н и е 10. Это уравнение корректно при условии, что

$$\cos \varphi > -\frac{1}{\varepsilon},$$

но именно этим углам соответствуют точки левой ветви гиперболы.