

Семинар – Лекция 6

СЛАБАЯ СХОДИМОСТЬ, ДАЛЬНЕЙШИЕ ФАКТЫ

§ 1. Примеры и контрпримеры

Определение 1. Множество M в банаховом пространстве B называется слабо замкнутым, если из $x_n \rightharpoonup x$, $\{x_n\} \subset M$ следует $x \in M$. (Иными словами, речь идёт о замкнутости в смысле слабой сходимости.)

Обсудим связь между замкнутостью множества в банаховом пространстве и его слабой замкнутостью.

ПРИМЕР 1. Всякое слабо замкнутое множество замкнуто.

□ Действительно, пусть M — слабо замкнутое множество в банаховом пространстве и $x_n \rightarrow x$. Тогда имеем $x_n \rightharpoonup x$, отсюда в силу условия слабой замкнутости $x \in M$, т. е. M — замкнутое множество. \square

ПРИМЕР 2. Обратное неверно: не всякое замкнутое множество слабо замкнуто.

□ Действительно, сфера $S_1 = \{x \mid \|x\| = 1\}$ в гильбертовом пространстве замкнута как прообраз замкнутого множества $\{1\}$ на числовой оси при отображении, осуществляемой непрерывной функцией «норма». Однако S_1 не является слабо замкнутым множеством, поскольку, как известно, $e_n \rightharpoonup \vartheta$ (здесь и далее, если речь идёт о гильбертовом пространстве, e_n — элементы ортонормированного базиса), но $\vartheta \notin S_1$. \square

ПРИМЕР 3. Замкнутое подпространство является слабо замкнутым.

□ В самом деле, пусть L — (замкнутое) подпространство банахова пространства B , $\{x_n\} \subset L$, $x_n \rightharpoonup x$. Докажем, что $x \in L$. Действительно, в противном случае по одному из следствий из теоремы Хана–Банаха существовал бы функционал $f \in L^*$, для которого $\|f\|_* = 1$, $f|_L = 0$, $\langle f, x \rangle = \|x\| \neq 0$. Тогда в силу слабой сходимости имели бы $0 = \langle f, x_n \rangle \rightarrow \langle f, x \rangle \neq 0$. Полученное противоречие доказывает требуемое утверждение. \square

Обсудим теперь некоторые случаи, которые могут возникнуть, когда не выполнено то или иное условие критерия сильной сходимости в равномерно выпуклых банаховых пространствах.

Например, может случиться так, что $u_n \rightharpoonup u$, $\|u_n\| \rightarrow C \neq \|u\|$.

ПРИМЕР 4. Так будет при $u_n = e_n$ в гильбертовом пространстве: $u_n \rightharpoonup \vartheta$, $\|u_n\| \rightarrow 1 \neq \|\vartheta\|$.

ПРИМЕР 5. Можно привести другой пример: пусть $B = L^2(\mathbb{R})$, $u_n = \chi_{[n;n+1]}(x)$. Тогда, очевидно, $\|u_n\| = 1$. При этом $u_n \rightharpoonup 0$.

1. В самом деле, в силу изоморфизма L^2 и $(L^2)^*$ достаточно показать, что при всех $v \in L^2(\mathbb{R})$ верно $(v, u_n) \rightarrow 0$. Имеем

$$\begin{aligned} (v, u_n) &= \int_{-\infty}^{+\infty} v(x)u_n(x) dx = \int_n^{n+1} v(x)u_n(x) dx \leq \\ &\leq \sqrt{\int_n^{n+1} |v(x)|^2 dx} \cdot \sqrt{\int_n^{n+1} |u_n(x)|^2 dx} = \\ &= \sqrt{\int_n^{n+1} |v(x)|^2 dx} \cdot 1 = \sqrt{\int_n^{n+1} |v(x)|^2 dx}. \quad (1.1) \end{aligned}$$

2. Поскольку

$$\|v\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \geq \sum_{n=1}^{+\infty} \int_n^{n+1} |v(x)|^2 dx,$$

в силу необходимого условия сходимости рядов имеем $\int_n^{n+1} |v(x)|^2 dx \rightarrow 0$, откуда в силу (1.1) заключаем, что $u_n \rightharpoonup 0$. \square

ПРИМЕР 6. Заменяя в каждом из предыдущих примеров u_{2k} на $\frac{1}{2}u_{2k}$, получим: $u_n \rightharpoonup \vartheta$, $\{\|u_n\|\}$ не имеет предела.

ПРИМЕР 7. Можно привести и обратный пример: $\|u_n\| \rightarrow C$, но при этом $\{u_n\}$ не является слабо сходящейся последовательностью.

1. Пусть, например, $x_0 \in H$ — некоторый ненулевой элемент гильбертова пространства H . Положим $u_n = (-1)^n(x_0 + e_n)$.

2. Тогда, очевидно, $u_{2k} \rightharpoonup x_0$, $u_{2k+1} \rightharpoonup -x_0$, что исключает возможность сходимости всякой числовой последовательности $\{\langle f, u_n \rangle\}$, если только $\langle f, x_0 \rangle \neq 0$. Что же касается сходимости норм, имеем

$$\|u_n\|^2 = \|x_0\|^2 + \|e_n\|^2 + 2\langle x_0, e_n \rangle = \|x_0\|^2 + 1 + 2\langle x_0, e_n \rangle \rightarrow \|x_0\|^2 + 1.$$

\square

Замечание 1. Мы говорим «не является слабо сходящейся», а не «не имеет слабого предела», потому что одним из возможных определений слабой сходимости является просто требование существования предела числовой последовательности $\{\langle f, u_n \rangle\}$ для всякого $f \in B^*$. Это, вообще говоря, ещё не гарантирует существования такого

элемента u , что $\langle f, u_n \rangle \rightarrow \langle f, u \rangle$ при всех $f \in B^*$. (См. Иосида. Функциональный анализ. Глава V.)

§ 2. Связь сильной и слабой сходимости

ПРИМЕР 8. Пусть $x_n \rightarrow x$ — слабо сходящаяся последовательность элементов гильбертова пространства H . Докажем, что из неё можно извлечь подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, для которой

$$\frac{1}{k}(x_{n_1} + \dots + x_{n_k}) \rightarrow x \quad \text{при } k \rightarrow \infty.$$

□

1. Рассмотрим сначала случай $x = \vartheta$. Положим $n_1 = 1$. Поскольку в силу условия слабой сходимости данной последовательности имеем $(x_n, x_{n_1}) \rightarrow 0$, то найдётся такое $n_2 > n_1$, что $|(x_{n_2}, x_{n_1})| \leq 1$.

2. Далее, по аналогичной причине существует такое $n_3 > n_2$, что $|(x_{n_3}, x_{n_1})| \leq \frac{1}{2}$, $|(x_{n_3}, x_{n_2})| \leq \frac{1}{2}$.

3. Продолжая эту процедуру далее, на каждом k -ом шаге построим такое $n_{k+1} > n_k$, что

$$|(x_{n_{k+1}}, x_{n_1})| \leq \frac{1}{k}, \dots, |(x_{n_{k+1}}, x_{n_k})| \leq \frac{1}{k}. \quad (2.1)$$

4. Заметим также, что в силу слабой сходимости последовательности $\{x_n\}$ можно утверждать её ограниченность: $\|x_n\| < C$. Имеем теперь

$$\begin{aligned} \left\| \frac{1}{k}(x_{n_1} + \dots + x_{n_k}) \right\|^2 &= \frac{1}{k^2} \left[\sum_{i=1}^k \|x_{n_i}\|^2 + 2 \sum_{i=1}^k \sum_{s=i+1}^k (x_{n_s}, x_{n_i}) \right] \leq \\ &\leq \frac{1}{k^2} \left[kC^2 + 2 \sum_{i=1}^k \sum_{s=i+1}^k \frac{1}{s-1} \right] = \frac{1}{k^2} \left[kC^2 + 2 \sum_{s=2}^k \sum_{i=1}^{s-1} \frac{1}{s-1} \right] = \\ &= \frac{1}{k^2} \left[kC^2 + 2 \sum_{s=2}^k \frac{s-1}{s-1} \right] \leq \frac{C^2 + 2}{k} \rightarrow 0, \end{aligned}$$

где в первом неравенстве мы учли оценку (2.1), а затем поменяли порядок суммирования в двойной сумме (рекомендуется сделать рисунок, поясняющий это изменение порядка).

5. Таким образом,

$$\frac{1}{k}(x_{n_1} + \dots + x_{n_k}) \rightarrow 0.$$

6. Для рассмотрения общего случая следует применить только что доказанный результат к последовательности $\{y_n\} \equiv \{x_n - x\}$. □

З а м е ч а н и е 2. Это утверждение является частным случаем теоремы Мазура: если $x_n \rightharpoonup x$ в банаховом пространстве B , то для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такая их выпуклая комбинация

$$y_k = \sum_{j=1}^k \alpha_j x_j, \quad \alpha_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^k \alpha_j = 1,$$

что $\|x - y_k\| \leq \varepsilon$. (См. Иосида. Функциональный анализ. Глава V.)

Это утверждение представляет интерес с точки зрения задач математической физики. В самом деле, если удаётся установить ограниченность последовательности $\{v_n\}$ приближённых решений (например, полученных по методу Галёркина), то в силу соответствующих теорем для сепарабельного или рефлексивного пространства устанавливается существование её слабо сходящейся подпоследовательности $v_{n_k} \rightharpoonup v$, а в силу упомянутого факта можно построить последовательность выпуклых комбинаций элементов $\{v_{n_k}\}$, сильно сходящуюся к тому же пределу v . Это полезно, в частности, тем, что свойства элементов последовательности $\{v_{n_k}\}$, инвариантные относительно образования выпуклой комбинации и предельного перехода (например, свойства гладкости или знакоопределённости), окажутся доказанными и для v , которое в типичной ситуации и будет точным решением.

§ 3. Пространство l^1 . Свойство Шура

Как мы помним, $(l^1)^* = m \equiv l^\infty$.

ПРИМЕР 9. Докажем, что в l^1 покоординатная сходимость слабее слабой сходимости. Для этого приведём пример последовательности $x^{(k)}$, не являющейся слабо сходящейся, но обладающей свойством покоординатной сходимости. (Здесь и далее по тексту верхний индекс будет означать номер элемента пространства, нижний — номер элемента числовой последовательности, образующей элемент пространства).

□

1. Положим

$$x^{(k)} = \left(\underbrace{\frac{1}{k}, \dots, \frac{1}{k}}_k, 0, 0, \dots \right).$$

2. Очевидно:

- 1) при всех $k \in \mathbb{N}$ $\|x^{(k)}\| = 1$,
- 2) имеет место покоординатная сходимость последовательности $\{x^{(k)}\}$ к нулевому элементу.

Покажем, что $\{x^{(k)}\}$ не сходится даже слабо (не говоря уже о сильной сходимости).

3. В самом деле, предположим противное: пусть $x^{(k)} \rightarrow x$. Тогда, положив

$$f_n = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n-1}, 1, 0, \dots) \in l^\infty$$

(заметим, что эти элементы нельзя называть базисными: в l^∞ не может существовать счётного базиса!), получим, что x заведомо является покоординатным пределом последовательности $\{x^{(k)}\}$.

4. Таким образом, с необходимостью $x = \vartheta$. Далее, положим $f = (1, 1, \dots) \in l^\infty$. Легко видеть, что $\langle f, x^{(k)} \rangle = 1 \rightarrow 1 \neq \langle f, \vartheta \rangle$, т. е. наше предположение о слабой сходимости привело к противоречию. \square

ПРИМЕР 10. Пространство l^1 интересно так называемым свойством Шура — в нём сильная и слабая сходимости равносильны. (Таким образом, не только конечномерные пространства могут обладать свойством Шура.) Докажем это интересное свойство методом «от противного».

\square

1. Итак, пусть $x^{(n)} \rightarrow x$. Аналогично п. 8 заменяя при необходимости $x^{(n)}$ на $x^{(n)} - x$, можно ограничиться рассмотрением случая $x = \vartheta$.

2. В этом случае, как показано в предыдущем примере, последовательность $\{x^{(n)}\}$ заведомо обладает свойством покоординатной сходимости к нулю. Предположим теперь, что $x^{(n)} \not\rightarrow \vartheta$. В таком случае имеется подпоследовательность $x^{(n_\alpha)}$, ограниченная от нуля, т. е. существует такое $M > 0$, что при всех $\alpha \in \mathbb{N}$ верно неравенство

$$\|x^{(n_\alpha)}\| \geq M. \quad (3.1)$$

3. С другой стороны, естественно,

$$\|x^{(n_\alpha)}\| < +\infty, \quad (3.2)$$

поскольку $x^{(n_\alpha)} \in l^1$. Теперь наша цель состоит в том, чтобы извлечь из $x^{(n_\alpha)}$ подпоследовательность $x^{(n_{\alpha_k})}$, не обладающую свойством слабой сходимости к ϑ .

4. Положим $\alpha_1 = 1$ и заметим, что в силу (3.1) и (3.2) найдётся такое m_1 , что

$$\sum_{i=m_1+1}^{\infty} |x_i^{(n_{\alpha_1})}| < \frac{M}{10}, \quad \sum_{i=1}^{m_1} |x_i^{(n_{\alpha_1})}| \geq \frac{4}{5}M.$$

5. Однако в силу свойства покоординатной сходимости к нулю имеем $x_i^{(n_\alpha)} \rightarrow 0$ при $\alpha \rightarrow \infty$ для всех i (напоминаем, i — номер «координаты» элемента), поэтому найдётся такое $\alpha_2 > \alpha_1$, что $\sum_{i=1}^{m_1} |x_i^{(n_{\alpha_2})}| < \frac{M}{10}$. (Здесь m_1 ранее зафиксировано!) Тогда $\sum_{i=m_1+1}^{\infty} |x_i^{(n_{\alpha_2})}| > \frac{9}{10}M$

и найдётся такое $m_2 > m_1$, что

$$\sum_{i=m_1+1}^{m_2} |x_i^{(n_{\alpha_2})}| \geq \frac{4}{5}M, \quad \sum_{i=m_2+1}^{\infty} |x_i^{(n_{\alpha_2})}| < \frac{M}{10}.$$

6. Продолжая эту процедуру аналогичным образом, построим строго возрастающие последовательности $\{m_k\}$ (где $m_0 = 0$), $\{\alpha_k\}$, для которых верно:

$$\sum_{i=1}^{m_{k-1}} |x_i^{(n_{\alpha_k})}| < \frac{M}{10}, \quad \sum_{i=m_{k-1}+1}^{m_k} |x_i^{(n_{\alpha_k})}| \geq \frac{4}{5}M, \quad \sum_{i=m_k+1}^{\infty} |x_i^{(n_{\alpha_k})}| < \frac{M}{10}. \quad (3.3)$$

7. Введём теперь в рассмотрение функционал $f = (c_1, c_2, \dots)$, где c_j выберем по следующему принципу. Для каждого $j \in \mathbb{N}$ найдём такое k , что $m_{k-1} \leq j \leq m_k$ (оно существует, поскольку в силу нашего построения целые неотрицательные числа m_k образуют возрастающую последовательность) и положим

$$c_j = \operatorname{sgn} x_j^{(n_{\alpha_k})}. \quad (3.4)$$

8. Очевидно, $f \in l^\infty$. Имеем теперь с учётом (3.3), (3.4)

$$\begin{aligned} \langle f, x^{(n_{\alpha_k})} \rangle &= \sum_{i=1}^{\infty} c_i x_i^{(n_{\alpha_k})} \geq \\ &\geq \sum_{i=m_{k-1}+1}^{m_k} c_i x_i^{(n_{\alpha_k})} - \sum_{i=1}^{m_{k-1}} |x_i^{(n_{\alpha_k})}| - \sum_{i=m_k+1}^{\infty} |x_i^{(n_{\alpha_k})}| \geq \\ &\geq \frac{4}{5}M - \frac{M}{10} - \frac{M}{10} = \frac{3}{5}M, \end{aligned}$$

т. е. $\langle f, x^{(n_{\alpha_k})} \rangle \not\rightarrow 0$ и $x^{(n_{\alpha_k})} \not\rightarrow \vartheta$, а следовательно, и $x^{(n)} \not\rightarrow \vartheta$. \square

Рекомендуется сделать рисунок, иллюстрирующий выбор подпоследовательностей и оценки отрезков сумм.

З а м е ч а н и е 3. Может показаться, что мы вывели сильную сходимость из покоординатной, что было бы очень странно с учётом предыдущего примера. На самом деле, конечно, это не так: мы специально использовали специально построенный функционал f , отличный от «координатных» функционалов.

§ 4. Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Возможно ли существование последовательности $\{u_n\}$, для которой $u_n \rightharpoonup \vartheta$, $\|u_n\| \rightarrow \infty$?

Задача 2. Доказать, что последовательность в банаховом пространстве может иметь не более одного слабого предела.

Задача 3. Пусть $A \in \mathcal{L}(B_1, B_2)$ (ограниченный линейный оператор, определённый на всём B_1), где B_1, B_2 — банаховы пространства. Доказать, что A непрерывен и в смысле слабой сходимости, т. е. если $x_n \rightharpoonup x$ в B_1 , то $Ax_n \rightharpoonup Ax$ в B_2 .

Задача 4. Пусть $A \in \mathcal{L}(B_1, B_2)$ и замыкание образа единичного шара $\{x \in B_1 \mid \|x\| \leq 1\}$ компактно в B_2 . (Такие линейные операторы называются вполне непрерывными.) Доказать, что A преобразует слабо сходящуюся последовательность в сильно сходящуюся, т. е. если $x_n \rightharpoonup x$ в B_1 , то $Ax_n \rightarrow Ax$ в B_2 .

Задача 5. Доказать, что если $A \in \mathcal{L}(H_1, H_2)$, где H_1, H_2 — сепарабельные гильбертовы пространства, то из того факта, что для любой слабо сходящейся последовательности $\{v_n\} \subset H_1$ последовательность $\{Av_n\}$ сильно сходится в H_2 , следует, что A — вполне непрерывный оператор.

Задача 6. Доказать, что всякое выпуклое замкнутое множество в банаховом пространстве слабо замкнуто. (Заметим, что отсюда сразу же следует слабая замкнутость (замкнутого) подпространства, которую мы установили непосредственно.)

Задача 7*. Пусть X — сепарабельное линейное нормированное пространство. Доказать, что в X^* существует счётное множество, всюду плотное в смысле *-слабой сходимости.